

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/391521392>

Aves del Parque Nacional Natural Sumapaz, Colombia.

Article in *Cotinga* · May 2025

CITATIONS

0

READS

254

2 authors:



[Sergio Chaparro-Herrera](#)

86 PUBLICATIONS 313 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Néstor Raúl Espejo Delgado](#)


11 PUBLICATIONS 45 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



COTINGA

Journal of Neotropical Birding and Conservation



Number 47

July 2025

Aves del Parque Nacional Natural Sumapaz, Colombia

Sergio Chaparro-Herrera y Néstor Espejo

Received 18 July 2024; final revision accepted 31 December 2024

Cotinga 47 (2025): 9–29

published online 5 May 2025

In Colombia, protected areas are the main strategy for nature conservation, and their rate of designation and expansion have increased since the 1960s. However, the creation and management of protected areas need to be supported by basic scientific data on their biodiversity. Large information gaps still prevail in most Colombian protected areas. To address the need for biodiversity information in protected areas, we present a comprehensive bird inventory for Parque Nacional Natural Sumapaz, which spans the departments of Cundinamarca, Meta and Huila, in the eastern Andes of Colombia. Our paper integrates previously unpublished inventory data, spanning 15 years, and secondary sources. We reveal a rich avifauna of 442 species, 317 of which correspond to our field observations. We highlight the presence of 5 species endemic to Colombia, 29 near-endemics, 8 threatened at the national level and 18 at global scale, and 45 boreal migrant species. This dataset holds critical significance for the effective planning and management of Parque Nacional Natural Sumapaz, aligning with its long-term conservation objectives. Lastly, we stress the urgent need for expanded sampling across various localities within the national park, particularly those with limited data. Information enhancement is vital for facilitating ongoing research efforts and advancing conservation initiatives within Parque Nacional Natural Sumapaz.

La declaración y expansión de áreas protegidas son estrategias de conservación importantes para evitar la pérdida de biodiversidad³⁰. A nivel mundial, la cobertura de áreas terrestres protegidas ha aumentado del 14,1% al 15,3% en la última década, y se espera que esta tendencia continúe^{24,35}. Colombia es uno de los países con mayor extensión de áreas protegidas en Latinoamérica. Su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) abarca el 16,4% de su territorio terrestre y 17,09% del territorio marino (c.49.875.957 ha)^{42,55}. Dentro del SINAP, los Parques Nacionales Naturales (PNN) son las áreas protegidas de mayor restricción en cuanto a conservación (categorías I y II de UICN)³⁰, y juntos cubren más de 12 millones de hectáreas declaradas. Los PNN presentan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad en múltiples escalas y comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies de fauna y flora, algunas de ellas amenazadas de extinción²⁰.

A escala regional, en la cordillera Oriental de Colombia la declaratoria de áreas protegidas ha sido una de las principales estrategias de conservación desde la segunda mitad del siglo XX⁵⁰. Esta región es un centro de diversidad de avifauna con altos niveles de endemismo, recambio de especies y áreas de importancia para aves residentes, migratorias y en riesgo de extinción^{13,14,16,21,23,53}. Sin embargo, en esta región aún persisten vacíos de información respecto a los patrones de riqueza de la avifauna en varias localidades, entre ellas las áreas protegidas del SINAP. El PNN Sumapaz, declarado como área protegida en 1977, abarca las áreas potenciales de distribución de gran parte de la avifauna de

montaña de la cordillera Oriental de Colombia. Presenta ecosistemas que van desde el páramo hasta los bosques altoandinos y subandinos, así como todo un sistema de lagunas altoandinas de importancia en la región^{32,37}. Pese a esta alta diversidad potencial, son pocas las localidades dentro del área protegida o de su zona amortiguadora que cuentan con información detallada de su avifauna. Esto se debe, principalmente, a problemas de conflicto armado histórico en la región, sumado a la dificultad de acceso a diferentes áreas por su complejidad topográfica³².

Las áreas protegidas, de manera general, conservan la biodiversidad a escalas espaciales gruesas como biomas, paisajes o ecosistemas³. Sin embargo, son pocos los estudios que emplean medidas directas de biodiversidad a una escala más fina como comunidades y/o poblaciones^{7,12}, por lo que es prioritaria la recolección de información primaria y la actualización de listados de especies. El presente estudio pretende aportar al conocimiento de la avifauna del PNN Sumapaz a través de una lista consolidada de su avifauna generada a partir de datos inéditos de inventarios realizados en los últimos 15 años, y una recopilación de registros secundarios. Esperamos que la información compilada ayude a llenar vacíos de información, y que estos registros actualizados de la avifauna sean insumos para la planificación y manejo del área protegida. También buscamos invitar a la comunidad científica a desarrollar trabajos de investigación que permitan comprender la distribución, composición y estructura de la avifauna a lo largo de esta área protegida.




Figura 1. Ubicación, biomas y sistema lagunar del Parque Nacional Natural Sumapaz, Andes Orientales de Colombia. Las estrellas amarillas indican las localidades de muestreo (ver Tabla 1) Chisacá y alrededores (Ch), Santa Rosa (SR), Parque Chaqué (CQ), Alto Caicedo (AC), Pantano Andabobos (B), Quebrada Honda (QH), Laguna Cerro Tuste (CT), Las Águilas (Ag), Colombia (Co), El Duda (D), Palomas (P), La Libertad Baja-Brisas del Tonoa (LB-BT), La Libertad Alta (LA), El Retiro (ER), Las Mirlas (LM). Los puntos naranja indican localidades de fuentes secundarias; el número corresponde a la fuente, ver sección Referencias: Chaparro-Herrera *et al.*¹³, eBird²², IAvH²⁹, Mayorga & Melo³⁶, Sierra⁵², UDFJC & IAvH⁵⁴, Espejo (ES; datos no publicados). Parte superior derecha: mapa de Colombia con las áreas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a nivel continental (SINAP).

Área de estudio

El PNN Sumapaz se encuentra en la cordillera Oriental de Colombia, en el complejo de páramo Cruz Verde-Sumapaz, con jurisdicción en 12 municipios de tres departamentos (Cundinamarca, Meta y Huila) y dos localidades de Bogotá Distrito Capital (Usme y Sumapaz)³² (Fig. 1). También hace parte, junto con los PNN Tinigua, Cordillera de Los Picachos y Sierra de la Macarena, del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) que, a su vez, es un Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA, por sus siglas en inglés)⁶. El PNN Sumapaz presenta una superficie de 221.749 ha, entre 700–4250 m de altitud, y comprende tres biomas principales: páramo (135.532 ha), bosque altoandino (75.234 ha) y bosque subandino (12.097 ha), y un sistema de lagunas altoandinas con más de 50 cuerpos de agua, todos ellos en lechos de origen glacial^{27,32} (Fig. 1).

Métodos

Realizamos la caracterización de la avifauna mediante recorridos libres no sistemáticos de uno o varios observadores, censos por transectos de distancia variable, puntos estacionales por carretera y recorridos a caballo, entre enero de 2008 y diciembre de 2023. Las observaciones se realizaron entre 05h50–11h00 y, ocasionalmente, entre 15h00–18h00, con la ayuda de binoculares 8x42 y una grabadora Zoom H4n para el registro de vocalizaciones. Caracterizamos 14 localidades al interior del parque, 10 en el bioma páramo y 4 en el bioma subandino (Tabla 1; Figs. 1–2). También realizamos una caracterización complementaria mediante recorridos libres en dos zonas amortiguadoras del PNN Sumapaz: (1) vereda Nazareth de la ciudad de Bogotá, en el Parque Temático Chaqué (bioma altoandino) y (2) Las Mirlas, municipio de Cubarral, departamento de Meta (bioma subandino) (Tabla 1; Fig. 1).

Para la identificación de la avifauna empleamos las guías de Hilty & Brown²⁸, Restall *et al.*⁴⁸,

Tabla 1. Localidades caracterizadas en el Parque Nacional Natural Sumapaz, entre enero de 2008 y diciembre de 2023. Las localidades marcadas con un asterisco corresponden a la zona amortiguadora.

Localidades caracterizadas, departamento	Siglas	Coordenadas	Bioma
Chisacá y alrededores, Cundinamarca	Ch	04°17'10,7"N, 74°12'29,2"O	Páramo
Santa Rosa, Cundinamarca	SR	04°13'25,0"N, 74°11'26,9"O	Páramo
Parque Chaquéen*, Cundinamarca	CQ	04°10'15,6"N, 74°08'53,2"O	Altoandino
Alto Caicedo, Cundinamarca	AC	04°09'01,1"N, 74°14'04,9"O	Páramo
Pantano Andabobos 1, Cundinamarca	BI	04°06'38,2"N, 74°15'06,1"O	Páramo
Pantano Andabobos 2, Cundinamarca	B2	04°06'49,0"N, 74°15'45,0"O	Páramo
Quebrada Honda, Cundinamarca	QH	04°05'00,2"N, 74°15'37,1"O	Páramo
Laguna Cerro Tuste, Cundinamarca	CT	03°47'38,8"N, 74°22'08,4"O	Páramo
Las Águilas, Cundinamarca	Ag	03°49'43,0"N, 74°25'05,5"O	Páramo
Colombia, Cundinamarca	Co	03°43'26,0"N, 74°25'59,9"O	Páramo
El Duda, Meta	D	03°46'18,1"N, 74°21'55,1"O	Páramo
Palomas, Meta	P	03°46'35,0"N, 73°55'40,1"O	Subandino
La Libertad Baja, Brisas del Tonoa, Meta	LB-BT	03°46'16,0"N, 73°54'19,1"O	Subandino
La Libertad Alta, Meta	LA	03°45'59,8"N, 73°54'35,6"O	Subandino
El Retiro, Meta	ER	03°44'48,8"N, 73°54'58,0"O	Subandino
Las Mirlas*, Meta	LM	03°48'02,5"N, 73°51'57,6"O	Subandino

Alderfer & Dunn¹ y Ayerbe-Quiñones⁴. Para la identificación de los registros auditivos utilizamos la guía sonora de Boesman⁸ y la base de datos del repositorio en línea xeno-canto (<http://www.xeno-canto.org>). Clasificamos las especies de acuerdo con su categoría de endemismo según Chaparro-Herrera *et al.*¹⁶, amenaza global según IUCN³¹, amenaza nacional según Renjifo *et al.*^{46,47}, tipo de migración según Naranjo *et al.*³⁸ y migración altitudinal según Barçante *et al.*⁵. Seguimos la nomenclatura a nivel de familias y especies de Remsen *et al.*⁴⁵ (diciembre de 2023).

Para complementar los datos de campo, consultamos en Google Académico (<https://scholar.google.com/>) con palabras clave como: ‘páramo Sumapaz’, ‘aves Sumapaz’, ‘avifauna Sumapaz’, ‘complejo Sumapaz’, ‘biodiversidad Sumapaz’ y ‘delimitación Sumapaz’, para estudios realizados al interior del PNN Sumapaz y en su zona de amortiguación. Finalmente, descargamos los datos de eBird²² de toda Colombia y extrajimos los datos de presencia en el PNN Sumapaz mediante la intersección de estos con el polígono de los límites del área protegida empleando el software QGIS (<https://qgis.org/>). En todos los casos, revisamos detalladamente los registros, y excluimos aquellos dudosos (por estar lejos de su distribución conocida o en casos de especies de difícil diferenciación) o con falta de evidencia (fotografías, audio o descripciones detalladas).

Resultados

Reportamos 442 especies pertenecientes a 56 familias; 317 especies fueron registradas mediante observaciones directas de los autores, de las cuales 80 especies son los únicos registros existentes en la zona, y 363 especies fueron reportadas en fuentes secundarias (Apéndice 1). Las familias más representativas fueron Thraupidae y Tyrannidae, con 64 y 61 especies, respectivamente, mientras que 11 familias estuvieron representadas por una especie (Apéndice 1). Algunas especies representativas se presentan en las Figs. 3–8.

De las 16 localidades que muestreamos, La Libertad Alta presentó mayor riqueza (100 especies), seguida de La Libertad Baja-Brisas del Tonoa (91 especies), Palomas (85 especies) y Las Mirlas (82 especies). Todas estas localidades corresponden al bioma subandino del departamento de Meta. Por su parte, las de menor riqueza fueron El Duda, Alto Caicedo y Santa Rosa (13, 16 y 17 especies, respectivamente), todas localidades del bioma páramo en los departamentos de Cundinamarca y Meta.

En cuanto a la revisión de información secundaria, encontramos un estudio realizado




Figura 2. Algunos de los hábitats presentes en el Parque Nacional Natural Sumapaz (Sergio Chaparro-Herrera): **A** páramo; **B** páramo y pantanos; **C** lagunas; y **D** bosque subandino.

en el denominado Transecto Sumapaz⁴⁴, algunas caracterizaciones realizadas en la laguna de Chisacá y áreas aledañas^{13,52}, el conjunto de datos “Aves del páramo de Sumapaz, Cundinamarca” publicados en el portal SIB Colombia²⁹, un estudio biótico en el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz⁵⁴ y el conjunto de datos de eBird²². Para las zonas de amortiguación, encontramos un estudio realizado en el municipio de Gutiérrez, departamento de Cundinamarca³⁶, y obtuvimos datos no publicados en la laguna de Chisacá y pantano de Andabobos (Espejo 2020, datos no publicados).

Del total de las especies reportadas, resaltamos la presencia de cinco especies endémicas de Colombia: Tingua Bogotana *Rallus semiplumbeus* (Fig. 4), Barbudito Paramuno *Oxyopogon guerini* (Fig. 7), Periquito Aliamarillo *Pyrrhura calliptera*, Cucarachero de Apolinar *Cistothorus apolinari* (Fig. 8) y Chango Colombiano *Hypopyrrhus pyrohypogaster*. Además, 29 casi endémicas de Colombia; 18 especies amenazadas a escala global (2 En Peligro [EN], 8 Vulnerable [VU] y 8 Casi Amenazadas [NT]) y 8 en distintas categorías de riesgo a escala nacional: 3 EN, 4 VU, 1 en Peligro Crítico (CR) (Apéndice 1). También resaltamos la



Figura 3. Guacharaca Variable *Ortalis guttata*, La Libertad Baja-Brisas del Tonoa, Meta, Colombia, octubre de 2017 (Sergio Chaparro-Herrera).

presencia de 2 especies migratorias australes, 45 migratorias boreales, 4 migratorias (2 australes, 2 boreales) que también tienen poblaciones residentes en el país, 14 migratorias altitudinales y 88 que posiblemente presentan migración altitudinal (Apéndice 1).



Figura 4. Tingua Bogotana *Rallus semiplumbeus*, Chisacá, Cundinamarca, Colombia, octubre de 2013 (Sergio Chaparro-Herrera).



Figura 5. Bienparado Mayor *Nyctibius grandis*, La Libertad Baja-Brisas del Tonoa, Meta, Colombia, noviembre de 2016 (Sergio Chaparro-Herrera).

Discusión

El PNN Sumapaz es la tercera área protegida de mayor extensión en la cordillera Oriental de Colombia, después del PNN El Cocuy y el PNN Cordillera de los Picachos⁵⁷. Por su ubicación geográfica dentro del AMEM, tiene una importancia significativa en la conectividad ecosistémica a lo largo del gradiente altitudinal entre el páramo y la zona basal amazónica y orinocense³². El PNN Sumapaz es una zona poco estudiada en términos biológicos, con un sesgo hacia estudios botánicos^{11,34,40,43,56}. Factores asociados al conflicto armado en el que ha estado inmersa la región^{32,41}, que ha dejado secuelas hasta hoy —como la presencia de minas antipersonales³²— hacen que aún sea difícil la exploración y toma de información en varios sectores del área protegida y zonas colindantes. Por ejemplo, el cerro Nevado de Sumapaz, punto más alto del departamento de Cundinamarca (4250



Figura 6. Pichí Pechiamarillo *Pteroglossus inscriptus*, La Libertad Baja-Brisas del Tonoa, Meta, Colombia, noviembre de 2016 (Sergio Chaparro-Herrera).



Figura 7. Barbudito Paramuno *Oxygogon guerini*, hembra, Pantano Andabobos, Cundinamarca, Colombia, noviembre de 2014 (Sergio Chaparro-Herrera).

m de altitud), solo ha sido explorado en términos botánicos en las décadas de 1970 y 1980¹⁷. En la hoya del río Nevado-Puerta de las Dantas (3400 m de altitud) existe una única exploración botánica de 1973¹⁹. Incluso existen áreas inexploradas en su totalidad como la saliente del río Guape, bioma andino con páramo, de gran interés biológico al ser un páramo aislado ubicado al suroriente del área protegida.

A pesar de las dificultades de acceso a varias zonas del PNN Sumapaz, se resalta la expedición realizada en 1981 en el denominado Transecto Sumapaz, en donde se realizaron catálogos de fauna, flora y estudios geomorfológicos; esta es, hasta la fecha, la información más robusta para algunos sectores del PNN Sumapaz⁵⁶. No obstante, esta expedición no contó con un muestreo en campo de aves, y la información consignada para avifauna (se reportan 823 especies) corresponde a información

secundaria inferida por rangos de distribución en un gradiente montañoso^{44,56}. Así, la mayor parte de la información primaria que se conoce sobre la avifauna del PNN Sumapaz proviene de pocas localidades con buena accesibilidad, como la laguna de Chisacá^{13,22,52}.

La plataforma eBird²² aportó la única evidencia de la presencia en el área protegida de tres especies: (1) Faloropo Tricolor *Phalaropus tricolor*, un individuo registrado en la laguna de Chisacá por R. Williams y P. Berrigan (<https://ebird.org/checklist/S33402315>); esta es una especie migratoria boreal registrada en Colombia principalmente en las costas Caribe y Pacífica, con reportes ocasionales al interior del país en los Andes^{22,28}; (2) Búho Real *Bubo virginianus*, un individuo registrado por N. Bayly en las cercanías de la laguna de Chisacá (<https://ebird.org/checklist/S24630798>) es el único registro en el parque y el primero en las zonas altas de la cordillera Oriental^{15,22}, y (3) Frutero Escamado *Ampelioides tshudii*, un individuo registrado y fotografiado por A. Rivera en La Libertad Alta (<https://ebird.org/checklist/S135138954>), es el único registro en el parque y uno de los pocos en las estribaciones de la cordillera Oriental al este de los Andes^{4,22,28,51}.

También encontramos localidades exploradas en la zona amortiguadora del PNN Sumapaz; la primera de ellas localizada en los municipios de Pasca, Cabrera y Une, departamento de Cundinamarca, en donde se registraron 100 especies⁵⁴. De esta caracterización eliminamos o excluimos seis especies luego de una revisión exhaustiva, ya que presentaban posibles errores de identificación; por ejemplo, el Colibrí Picolezna *Opisthoprora euryptera*, colectado pero erróneamente identificado porque se trata de una hembra de Colibrí Piquicorto Común *Ramphomicron microrhynchum* (re-identificada por Socorro Sierra de la colección de aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt). Otra caracterización se llevó a cabo en el municipio de Gutiérrez³⁶, registrando 81 especies, entre las que desatacan el Alcaraván Americano *Hesperoburhinus bistriatus* (se amplía el rango de elevación conocido⁴ hasta 3200 m) y el Águila Crestada *Spizaetus isidori*, por su grado de amenaza (En Peligro)⁴⁶.

La información que presentamos en este artículo, a pesar de que no cubre de manera representativa todos los ecosistemas y sectores del PNN Sumapaz, se convierte en un insumo para el desarrollo de políticas para la conservación de la biodiversidad y para la selección de especies objeto de conservación y monitoreo, particularmente de aquellas endémicas, amenazadas, restringidas, carismáticas, simbólicas, especies sombrilla, especies paisaje o restringidas a un tipo de



Figura 8. Cucarachero de Apolinar *Cistothorus apolinari*, Chisacá, Cundinamarca, Colombia, octubre de 2013 (Sergio Chaparro-Herrera).

ecosistema como el páramo, un bioma considerado como centro de diversificación y endemismo con características físico-bióticas únicas^{9,25,33,49}. El monitoreo biológico es necesario debido a que ha existido en los últimos años un aumento significativo en la tasa de deforestación en la mayoría de las áreas protegidas de Colombia y sus zonas amortiguadoras asociado a dinámicas de posconflicto¹⁸. Puntualmente, el PNN Sumapaz presenta una preocupante tasa de pérdida de cobertura vegetal/boscosa del 68,3% al interior y 198,5% en su zona amortiguadora¹⁸. Es importante, por tanto, evaluar el estado poblacional de especies en algún grado de amenaza, su uso de hábitat, su ecología, así como su vinculación a análisis de integridad ecológica funcional como instrumento para medir la efectividad de manejo del área protegida y para evaluar el cumplimiento de sus objetivos de conservación^{2,26,39}.

Agradecimientos

Agradecemos a C. Lora, D. Callejas, M. Pardo, Y. Ávila y al equipo PNN Sumapaz por la asistencia en campo; al coronel W. Urrego y al Batallón de Alta Montaña No. 1 Tc Antonio Arredondo por el acompañamiento y hospitalidad en algunas jornadas de campo; a E. F. Quintero por su compañía en algunas salidas de campo y por su empeño en conocer la avifauna de Cubarral-Meta. Finalmente agradecemos al editor y a Camila Gómez y una revisora anónima por sus aportes al manuscrito.

Referencias

1. Alderfer, J. & Dunn J. L. (eds.) (2014) *National Geographic complete birds of North America*. Washington DC: National Geographic Books.
2. Alexandrino, E. R., Buechley, E. R., Piratelli, A. J., de Barros, K. M. P. M., de Andrade Moral, R., Sekercioglu, Ç. H., Rodrigues, S. & do Couto, H. T. Z. (2016) Bird sensitivity to disturbance as an indicator of forest patch conditions: an issue

- in environmental assessments. *Ecol. Indic.* 66: 369–381.
3. Andam, K., Ferraro, P., Pfaff, A., Sánchez-Azofeifa, G. A. & Robalino, J. (2008) Measuring the effectiveness of protected area networks in reducing deforestation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 105: 16089–16094.
 4. Ayerbe-Quinones, F. (2018) *Guía ilustrada de la avifauna colombiana*. Bogotá: Wildlife Conservation Society.
 5. Barçante, L., Vale, M. V. & Alves, M. A. S. (2017) Altitudinal migration by birds: a review of the literature and a comprehensive list of species. *J. Field Orn.* 88: 321–335.
 6. BirdLife International (2020) *Important Bird Areas factsheet: Sumapaz Natural National Park*. <http://datazone.birdlife.org> (accedido 3 abril 2024).
 7. Brodie, J., Mohd-Azlan, J., Chen, C., Wearn, O., Deith, M., Ball, J., Slade, E., Burslem, D., Teoh, S., Williams, P., Nguyen, A., Moore, J., Goetz, S., Burns, P., Jantz, P., Hakkenberg, C., Kaszta, Z., Cushman, S., Coomes, D. & Luskin, M. (2023) Landscape-scale benefits of protected areas for tropical biodiversity. *Nature* 620: 807–812.
 8. Boesman, P. (2012) *Birds of Colombia, MP3 sound collection*. CD. Winsum: Birdsounds.nl.
 9. Buytaert, W., Iñiguez, V. & Bièvre, B. (2007) The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean páramo. *For. Ecol. Manag.* 251: 22–30.
 10. Callejas, J. & Chaparro-Herrera, S. (2018) Presencia del Chango Colombiano *Hypopyrrhus pyrohypogaster* en el departamento del Meta, Colombia. *Cotinga* 40: 95–97.
 11. Camacho, E. D. (2018) Efecto del cambio climático en la distribución demográfica de *Espeletia grandiflora*, Asteraceae, en el páramo de Sumapaz. Tesis Pregrado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
 12. Cazalis, V., Princé, K., Mihoub, J. B., Kelly, J., Butchart, S. H. & Rodrigues, A. H. (2020) Effectiveness of protected areas in conserving tropical forest birds. *Nat. Comm.* 11: 4461.
 13. Chaparro-Herrera, S., Lopera-Salazar, A. & Stiles F. G. (2018) Aves del departamento de Cundinamarca, Colombia: conocimiento, nuevos registros y vacíos de información. *Biota Colomb.* 19: 160–189.
 14. Chaparro-Herrera, S., Espejo-Delgado, N., Lopera-Salazar, A., León-León, J. F., Santos, D. & Páez-Rodríguez, N. (2020) Aves de Mámbita: lista de especies y nuevos registros en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, Cundinamarca, Colombia. *Cotinga* 42: 82–100.
 15. Chaparro-Herrera, S., Enriquez P. L. & Lopera-Salazar, A. (2021) *Los búhos de Colombia: guía ilustrada*. Bogotá: Grupo de Especialistas en Búhos Neotropicales.
 16. Chaparro-Herrera, S., Lozano, M. & Echeverry-Galvis, M. A. (2024) Listado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia: evaluación 2013-2023. *Orn. Colomb.* 25: 34–45.
 17. Cleef, A. M. (2008). Humid cloud superparamo probably acts as a plant diversity centre as a cool refuge: the case of Nevado de Sumapaz, Colombia. En: van der Hammen, T. (ed.) *Estudios de ecosistemas tropandinos-Ecoandes, 7: la Cordillera Oriental Colombiana, transecto Sumapaz*. Stuttgart: J. Cramer.
 18. Clerici, N., Armenteras, D., Kareiva, P., Botero, R., Ramírez-Delgado, J. P., Forero-Medina, G., Ochoa, J., Pedraza, C., Schneider, L., Lora, L., Gómez, C., Linares, M., Hirashik, C. & Biggs, D. (2020) Deforestation in Colombian protected areas increased during post-conflict periods. *Sci. Rep.* 10: 1–10.
 19. Cuatrecasas, J. (2013) *A systematic study of the subtribe Espeletiinae (Heliantheae, Asteraceae)*. Memoirs of the New York Botanical Garden, 107. New York: New York Botanical Garden Press.
 20. DNAP (2021) *Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia. Documento CONPES 4050. Política para la consolidación de Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
 21. Diazgranados, M. (2015) Una mirada biológica a los páramos circundantes de la Sabana de Bogotá. En: Guhl, N. E. (ed.) *Los páramos circundantes de la Sabana de Bogotá. 2ª ed.* Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
 22. eBird (2023) *eBird: una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves*. Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology. www.ebird.org (accedido diciembre de 2023).
 23. González, A. M., Espejo, N., Armenteras, D., Hobson, K. A., Kardynal, K. J., Mitchell, G. W., Mahony, N., Bishop, C. A., Negret, P. J. & Wilson, S. (2023) Habitat protection and restoration: win-win opportunities for migratory birds in the northern Andes. *Perspect. Ecol. Conserv.* 21: 33–40.
 24. Gurney, G., Adams, V., Álvarez-Romero, J. & Claudet, J. (2023) Area-based conservation: taking stock and looking ahead. *One Earth* 6: 98–104.
 25. Granizo, T., Molina, M. E., Secaira, E., Herrera, B., Benítez, S., Maldonado, O., Libby, M., Arroyo, P., Ísola, S. & Castro, M. (2006) *Manual de planificación para la conservación de áreas, PCA*. Quito: TNC & USAID.
 26. Gray, C. L., Hill, S. L., Newbold, T., Hudson, L. N., Börger, L., Contu, S., Hoskins, A. J., Ferrier, S., Purvis, A. & Scharlemann, J. P. (2016) Local biodiversity is higher inside than outside terrestrial protected areas worldwide. *Nat. Comm.* 7: 12306.
 27. Guhl, N. E. (2015) *Los páramos circundantes de la Sabana de Bogotá. 2ª ed.* Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
 28. Hilty, S. L. & Brown, W. L. (1986) *A guide to the birds of Colombia*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
 29. IAVH (2018) *Aves del páramo de Sumapaz, Cundinamarca-Proyecto Colombia Bio*. Bogotá:

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
30. IUCN (2010) *50 years of working for protected areas: a brief history of IUCN World Commission on Protected Areas*. Gland, Switzerland: IUCN.
 31. IUCN (2024) *The IUCN Red List of threatened species*. Version 2024-2. <https://www.iucnredlist.org> (accedido diciembre 2024).
 32. Lora, C. A., Ruíz, L., Rodríguez, L. D., Bermúdez, S. I., Manrique, C. A., Lombana, J. M., Palacios, A., Chaparro, S., Hernández, L. C., Callejas, D. J., Ruíz, M. A., Guzmán, J. M., Funeme, A., Fajardo, R. E., Villalva, Y. P., Rodríguez, A., Orjuela, E., Cortés, H. & Rivera, A. Y. (2018) *Documento técnico de soporte para la actualización del plan de manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz 2017–2022*. Bogotá: Parque Nacional Natural Sumapaz, dirección territorial Orinoquia, Parques Nacionales Naturales de Colombia.
 33. Madriñán, S., Cortés, A. J. & Richardson, J. E. (2013) Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. *Front. Genet.* 4: 192.
 34. Mariño, A. A. (2017) Efecto del cambio climático en la distribución demográfica de *Espeletia summapacis*. Tesis Pregrado. Bogotá: Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia.
 35. Maxwell, S. L., Cazalis, V., Dudley, N., Hoffmann, M., Rodrigues, A. S. L., Stolton, S., Visconti, P., Woodley, S., Kingston, N., Lewis, E., Maron, M., Strassburg, B. B. N., Wenger, A., Jonas, H. D., Venter, O. & Watson, J. E. M. (2020) Area-based conservation in the twenty-first century. *Nature* 586: 217–227.
 36. Mayorga, J. A. & Melo, J. A. (2014) Aves de la vereda San Gil, municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. *Rev. Científica* 19: 118–133.
 37. Morales, M., Otero, J., van der Hammen, T., Torres, A., Cadena, C., Pedraza, C., Rodríguez, N., Franco, C., Betancourth, J. C., Olaya, E., Posada, E. & Cárdenas, L. (2007) *Atlas de páramos de Colombia*. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
 38. Naranjo, L. G., Amaya, J. D., Eusse-González, D. & Cifuentes-Sarmiento Y. (eds.) (2012) *Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia. Aves, 1*. Bogotá: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & World Wildlife Fund.
 39. Parrish, J. D., Braun, D. P. & Unnasch, R. S. (2003) Are we conserving what we say we are? Measuring ecological integrity within protected areas. *BioScience* 53: 851–860.
 40. Pedraza-Peñalosa, P., Betancur, J. B. & Rosselli, P. F. (2004) *Chisacá, un recorrido por los páramos andinos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
 41. Pérez, M. (2004) La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro. *Cuad. Desarr. Rural* 51: 61–90.
 42. Parques Nacionales Naturales (2024) *Registro único nacional de áreas protegidas*. Bogotá: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
 43. Quinche, D. A. (2017) Efecto demográfico del cambio climático sobre *Espeletia killipii*. Trabajo de Grado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
 44. Rangel, J. O. & Caycedo, P. (2008) Aves de la región del transecto Sumapaz. En: van der Hammen, T. (ed.) *Estudios de ecosistemas Tropandinos–Ecoandes, 7: la Cordillera Oriental Colombiana, transecto Sumapaz*. Stuttgart: J. Cramer.
 45. Remsen, J. V., Jr., Areta, J. I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Del-Rio, G., Jaramillo, A., Lane, D. F., Robbins, M. B., Stiles, F. G. & Zimmer, K. J. (2023) *A classification of the bird species of South America*. Baton Rouge, LA: Louisiana State Univ. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm> (accedido diciembre 2023).
 46. Renjifo, L. M., Gómez, M. F., Velásquez-Tibatá, J., Amaya-Villarreal, A. M., Kattan, G. H., Amaya-Espinel, J. D. & Burbano-Girón, J. (eds.) (2014) *Libro rojo de aves de Colombia, 1*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana & Instituto Alexander von Humboldt.
 47. Renjifo, L. M., Amaya-Villarreal, A. M., Burbano-Girón, J. & Velásquez-Tibatá, J. (eds.) (2016) *Libro rojo de aves de Colombia, 2*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana & Instituto Alexander von Humboldt.
 48. Restall, R. L., Rodner, C. & Lentino, M. (2007) *Birds of northern South America: an identification guide*. New Haven, CT: Yale Univ. Press.
 49. Roncancio-Duque, N. J. & Vanegas, L. A. V. (2019) Valores objeto de conservación del subsistema de áreas protegidas de los Andes occidentales, Colombia. *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact.* 43: 52–64.
 50. Rodríguez, N., Armenteras, D. & Retana, J. (2012) Effectiveness of protected areas in the Colombian Andes: Deforestation, fire and land-use changes. *Reg. Environ. Change* 13: 423–435.
 51. Salaman, P. G. & Stiles, F. G. (2002) New and noteworthy bird records from the east slope of the Andes of Colombia. *Caldasia* 24: 157–189.
 52. Sierra, M. (2015) Composición de la comunidad de aves e identificación de las especies prioritarias para la conservación en el complejo lagunar de la vereda Chisacá, Páramo de Sumapaz. Trabajo de Grado. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
 53. Stattersfield, A. J., Crosby, M. J., Long, A. J. & Wege, D. C. (1998) *Endemic Bird Areas of the world: priorities for biodiversity conservation*. Cambridge, UK: BirdLife International.
 54. UDFJC & IAvH (2015) *Estudios bióticos: plantas, edafofauna epígea, anfibios y aves en los complejos de páramos Cruz Verde-Sumapaz, Versión 2.1*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas & Instituto de

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

55. UNEP-WCMC & IUCN (2023) *Protected planet: the world database on protected areas (WDPA)/ the global database on protected areas management effectiveness (GD-PAME)*. www.protectedplanet.net (accedido diciembre 2023).

56. van der Hammen, T. (ed.) (2008) *Estudios de ecosistemas tropandinos–Ecoandes, 7: la Cordillera Oriental Colombiana, transecto Sumapaz*. Stuttgart: J. Cramer.

57. Vásquez, V. H. & Serrano, M. (2009) *Las áreas naturales protegidas de Colombia*. Bogotá: Conservación Internacional-Colombia & Fundación Biocolombia.

Sergio Chaparro-Herrera
Fundación Humedales, Bogotá, Colombia; Laboratorio de Ecología Evolutiva y Urbana, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia; Proyecto Atlapetes, Antioquia, Colombia. E-mail: sergioupn@gmail.com.

Néstor Espejo
Parques Nacionales Naturales de Colombia, Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Bogotá Colombia. E-mail: pozoydiddi@gmail.com.

Apéndice I. Aves registradas en el Parque Nacional Natural Sumapaz entre enero de 2008 y diciembre de 2023 a partir de nuestras localidades de muestreo (ver Tabla I): Chisacá y alrededores (Ch), Santa Rosa (SR), Parque Chaqué (CQ), Alto Caicedo (AC), Pantano Andabobos (B), Quebrada Honda (QH), Laguna Cerro Tuste (CT), Las Águilas (Ag), Colombia (Co), El Duda (D), Palomas (P), La Libertad Baja-Brisas del Tonoa (LB-BT), La Libertad Alta (LA), El Retiro (ER), Las Miras (LM). Registro: visual (V), grabación (G), fotografía (F); y fuentes secundarias (ver Métodos): Callejas & Chaparro-Herrera¹⁰, Chaparro-Herrera *et al.*¹³, eBird²², IAvH²⁹, Mayorga & Melo³⁶, Sierra⁵², UDFJC & IAvH⁵⁴, Espejo (datos no publicados) (ES). Endemismo: E (endémica), CE (casi endémica). Estatus de conservación global: NT (Casi Amenazada), VU (Vulnerable), EN (En Peligro), CR (Peligro Crítico), en paréntesis la categoría nacional. Migración: Mb (boreal), Ma (austral), R (con poblaciones residentes), Al (altitudinal), P (probablemente presenta migración altitudinal). Empleamos la taxonomía de Remsen *et al.*⁴⁵ (diciembre de 2023).

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
TINAMIDAE					
<i>Nothocercus bonapartei</i>	Highland Tinamou	ER	A		
<i>Crypturellus cinereus</i>	Cinereous Tinamou	ER, LB-BT, LM	V, A		
<i>Crypturellus soui</i>	Little Tinamou	LM	V, A		
ANATIDAE					
<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-Duck		V	36	
<i>Spatula discors</i>	Blue-winged Teal	Ch	V, A, F	22, 52, ES	Mb-R
<i>Anas andium</i>	Andean Teal	B, Ch, CT	V, A, F	13, 22, 29, 36, 52, ES	CE
<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup		V	22	Mb
<i>Nomonyx dominicus</i>	Masked Duck		V	22	
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Ruddy Duck	Ch	V, F	13, 22, 36, 52, ES	(EN), Al
CRACIDAE					
<i>Penelope argyrotis</i>	Band-tailed Guan		V	22	
<i>Penelope montagnii</i>	Andean Guan	CQ	V, A, F	22, 36, 54	
<i>Aburria aburri</i>	Wattled Guan	ER	V, A		
<i>Ortalis guttata</i>	Speckled Chachalaca	LA, LB-BT, LM	V, A, F	22	
ODONTOPHORIDAE					
<i>Colinus cristatus</i>	Crested Bobwhite	LM, P	V, A	22	
<i>Odontophorus gujanensis</i>	Marbled Wood-Quail	LM	A		
PODICIPEDIDAE					
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe		V	22	
<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe		V	22	

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
COLUMBIDAE					
<i>Patagioenas speciosa</i>	Scaled Pigeon	LM	V		
<i>Patagioenas fasciata</i>	Band-tailed Pigeon	CQ	V,A,F	22,36,54	P
<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pale-vented Pigeon	ER, LB-BT, LM, P	V,A,F		
<i>Patagioenas plumbea</i>	Plumbeous Pigeon	LB-BT	V		AI
<i>Patagioenas subvinacea</i>	Ruddy Pigeon	ER, LA	V,A	22	P
<i>Geotrygon montana</i>	Ruddy Quail-Dove	ER	V,A		
<i>Leptotila verreauxi</i>	White-tipped Dove		V	22	
<i>Zentrygon linearis</i>	Lined Quail-Dove		V	22	CE
<i>Zenaida auriculata</i>	Eared Dove	Ag, CT, LM	V,A,F	22	
<i>Columbina talpacoti</i>	Ruddy Ground Dove	LB-BT, P	V,A,F		
<i>Columbina squammata</i>	Scaled Dove	LB-BT	V,A,F		
CUCULIDAE					
<i>Crotophaga major</i>	Greater Ani	LM	V,A,F		
<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani	ER, LA, LB-BT, LM, P	V,A,F	22	
<i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo	ER, LA, LB-BT, LM, P	V,A	22	
<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo	LB-BT	V	22	Mb
NYCTIBIIDAE					
<i>Nyctibius grandis</i>	Great Potoo	LB-BT	V,A,F		
CAPRIMULGIDAE					
<i>Systellura longirostris</i>	Band-winged Nightjar		V	22	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Common Pauraque	LM	V,A		
APODIDAE					
<i>Streptoprocne rutilla</i>	Chestnut-collared Swift	LB-BT, LM, P	V	22	P
<i>Streptoprocne zonaris</i>	White-collared Swift	ER	V	22,54	
<i>Chaetura cinereiventris</i>	Grey-rumped Swift	ER	V		P
<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift	Ch	V	13,22	VU, Mb
TROCHILIDAE					
<i>Phaethornis atrimentalis</i>	Black-throated Hermit	P	V		
<i>Phaethornis griseogularis</i>	Grey-chinned Hermit		V	22	
<i>Phaethornis augusti</i>	Sooty-capped Hermit	LB-BT, LM, P	V,A	22	
<i>Phaethornis guy</i>	Green Hermit	P	V,A	22	P
<i>Doryfera ludovicae</i>	Green-fronted Lancebill	CQ, ER	V		P
<i>Doryfera johannae</i>	Blue-fronted Lancebill		V	22	P
<i>Colibri cyanotus</i>	Lesser Violetear		V	22	P
<i>Colibri coruscans</i>	Sparkling Violetear	Ch, CQ, D	V,A,F	13,22,29,36,54	P
<i>Heliangelus amethysticollis</i>	Amethyst-throated Sunangel	CQ	V,A	22	
<i>Heliangelus exortis</i>	Tourmaline Sunangel		V	36,54	CE, P
<i>Adelomyia melanogenys</i>	Speckled Hummingbird	ER, LA	V,F	22,36	P
<i>Aglaiaocercus kingii</i>	Long-tailed Sylph	CQ, LA	V,F	22,36	AI
<i>Lesbia victoriae</i>	Black-tailed Trainbearer	Ag, Ch, Co, CQ, QH	V	13,22,29,36,54,ES	
<i>Lesbia nuna</i>	Green-tailed Trainbearer	B, Ch, CQ		22	P

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Ramphomicon microrhynchum</i>	Purple-backed Thornbill	Ag,Ch,Co,QH,SR	V,F	13,22,29,54	
<i>Oxygogon guerinii</i>	Green-bearded Helmetcrest	AC,Ag,B,Ch,Co,CT,D,QH	V,F	13,22,29,52,54,ES	E, P
<i>Chalcostigma heteropogon</i>	Bronze-tailed Thornbill	AC,Ag,Ch,Co,CT,D,QH,SR	V,F	13,22,29,36,52,54,ES	CE, P
<i>Metallura tyrianthina</i>	Tyrian Metaltail	Ch,CQ	V,A,F	22,29,36,52,54,ES	P
<i>Haplophaedia aureliae</i>	Greenish Puffleg		V	22	CE, P
<i>Eriocnemis vestita</i>	Glowing Puffleg	Ag	V	22,29,36,52,54	
<i>Eriocnemis cupreiventris</i>	Coppery-bellied Puffleg		V	22,29,54	CE
<i>Aglaeactis cupripennis</i>	Shining Sunbeam	AC,Ag,Ch,Co,CT,D,QH	V	13,22,29,52,54,ES	AI
<i>Coeligena torquata</i>	Collared Inca		V	36,54	P
<i>Coeligena bonapartei</i>	Golden-bellied Starfrontlet		V	54	CE, P
<i>Coeligena helianthea</i>	Blue-throated Starfrontlet	CQ	V	22,36,54	CE, P
<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	Mountain Velvetbreast	CQ	V	22,36,54	P
<i>Ensifera ensifera</i>	Sword-billed Hummingbird	CQ	V	22	
<i>Pterophanes cyanopterus</i>	Great Sapphirewing	Ch,QH,SR	V,F	13,22,54	
<i>Ocreatus underwoodii</i>	Booted Racket-tail	ER,LA	V,A	22	AI
<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	Violet-fronted Brilliant	ER	V		P
<i>Chaetocercus mulsant</i>	White-bellied Woodstar	Ch,CQ	V	13,22	
<i>Chlorostilbon poortmani</i>	Short-tailed Emerald	CQ	V	22,36	CE
<i>Chalybura buffonii</i>	White-vented Plumeleteer	P	V,F	22	
<i>Saucerottia viridigaster</i>	Green-bellied Hummingbird	LA	V	22	
<i>Chrysouronia oenone</i>	Golden-tailed Sapphire	ER,LA,LB-BT,P	V	22	
<i>Chionomesa fimbriata</i>	Glittering-throated Emerald	LB-BT	V,F		
OPISTHOCOMIDAE					
<i>Opisthocomus hoazin</i>	Hoatzin	LB-BT,LM	V,F		
RALLIDAE					
<i>Rallus semiplumbeus</i>	Bogota Rail	Ch	V,A,F	13,22,52,ES	E, VU(EN)
<i>Porphyrio martinica</i>	Purple Gallinule		V	22	
<i>Aramides cajaneus</i>	Grey-cowled Wood-Rail	LM	V,A	22	
<i>Porzana carolina</i>	Sora		V	22,52	Mb
<i>Gallinula galeata</i>	Common Gallinule		V	22	AI
<i>Fulica americana</i>	American Coot	Ch	V,F	13,22,29,52,ES	AI
CHARADRIIDAE					
<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden-Plover	Ch	V	22	Mb
<i>Pluvialis squatarola</i>	Black-bellied Plover		V	13	VU, Mb
<i>Vanellus chilensis</i>	Southern Lapwing	Ch,ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22,29	
BURHINIDAE					
<i>Hesperoburhinus bistratus</i>	Double-striped Thick-knee	LM	V	36	
SCOLOPACIDAE					
<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper	Ch	V,F	13,22	Mb
<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper		V	22	NT, Mb

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper		V	22	VU, Mb
<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper		V	22	Mb
<i>Gallinago jamesoni</i>	Jameson's Snipe		V	22	
<i>Gallinago nobilis</i>	Noble Snipe	AC,B,Ch,QH	V,F	13,22,29,52,54,ES	CE, NT
<i>Gallinago delicata</i>	Wilson's Snipe		V	22,52	Mb
<i>Phalaropus tricolor</i>	Wilson's Phalarope		V	22	Mb
<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	Ch	V,F	13,22,52	Mb
<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper		V	22,52,ES	Mb
<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs	B,Ch	V,F	13,22,29,52,ES	NT, Mb
<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs		V	22,52	VU, Mb
JACANIDAE					
<i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana	LB-BT	V		
LARIDAE					
<i>Leucophaeus atricilla</i>	Laughing Gull		V	22	Mb
<i>Phaetusa simplex</i>	Large-billed Tern		V	22	
PHALACROCORACIDAE					
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Neotropic Cormorant		V	22	P
ARDEIDAE					
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Fasciated Tiger-Heron	P	V	36	
<i>Butorides striata</i>	Striated Heron		V	22	
<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	ER,LB-BT,LM,P	V,F	22	P
<i>Ardea alba</i>	Great Egret		V	22	
<i>Syrigma sibilatrix</i>	Whistling Heron	LM	V,A,F		
<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron	Ch	V,F	22	Mb
THRESKIORNITHIDAE					
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Green Ibis	LB-BT	V,A		
<i>Phimosus infuscatus</i>	Bare-faced Ibis	LB-BT,LM	V,A,F	22	
<i>Theristicus caudatus</i>	Buff-necked Ibis	LM	V,A		
CATHARTIDAE					
<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture	CQ,ER,LB-BT,LM,P	V,F	22,36	P
<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture	Ch,LB-BT,LM,P	V	22	
PANDIONIDAE					
<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey		V	22	Mb
ACCIPITRIDAE					
<i>Elanus leucurus</i>	White-tailed Kite		V	22,54	
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Hook-billed Kite		V	22	P
<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite	ER	V	22	P
<i>Spizaetus isidori</i>	Black-and-chestnut Eagle		V	36	EN(EN)
<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite	LB-BT,P	V		P
<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk	Ch	V	13,22	P
<i>Rupornis magnirostris</i>	Roadside Hawk	ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22,36,54	
<i>Parabuteo leucorhous</i>	White-rumped Hawk		V	54	

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	White-tailed Hawk		V	22,ES	
<i>Geranoaetus melanocephalus</i>	Black-chested Buzzard-Eagle	AC,Ag,B,Ch,Co,QH	V,F	13,22,29,36,52,54	
<i>Buteo nitidus</i>	Grey-lined Hawk	P	V,A		
<i>Buteo platypterus</i>	Broad-winged Hawk	LA	V	22	Mb
<i>Buteo swainsoni</i>	Swainson's Hawk		V	22	Mb
TYTONIDAE					
<i>Tyto furcata</i>	American Barn-Owl	LM	V		
STRIGIDAE					
<i>Megascops choliba</i>	Tropical Screech-Owl	LA,LM	V,A	22	
<i>Megascops ingens</i>	Rufescent Screech-Owl	LA	A		
<i>Bubo virginianus</i>	Great Horned Owl		V	22	
<i>Glaucidium jardinii</i>	Andean Pygmy-Owl		V	22	
<i>Asio stygius</i>	Stygian Owl	Ch	V	22	
<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl		V	22	
TROGONIDAE					
<i>Pharomachrus auriceps</i>	Golden-headed Quetzal		V	36	
<i>Trogon collaris</i>	Collared Trogon	LA	V,A	22	P
<i>Trogon personatus</i>	Masked Trogon		V	54	
BUCCONIDAE					
<i>Malacoptila fulvogularis</i>	Black-streaked Puffbird		V	22	
CAPITONIDAE					
<i>Capito auratus</i>	Gilded Barbet	LB-BT	V,A	22	
<i>Eubucco bourcierii</i>	Red-headed Barbet	ER,LA,P	V,A,F	22	P
RAMPHASTIDAE					
<i>Ramphastos ambiguus</i>	Yellow-throated Toucan	ER	V,A		
<i>Ramphastos tucanus</i>	White-throated Toucan	LM	V,A	22	
<i>Ramphastos vitellinus</i>	Channel-billed Toucan	LB-BT	V,A		
<i>Aulacorhynchus albigutta</i>	Southern Emerald-Toucanet		V	36	P
<i>Aulacorhynchus haematopygus</i>	Crimson-rumped Toucanet	LA	V,A	22	CE
<i>Andigena nigrirostris</i>	Black-billed Mountain-Toucan		V	22,36,54	CE
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	Lettered Aracari	LB-BT	V,A		
<i>Pteroglossus castanotis</i>	Chestnut-eared Aracari	LB-BT,LM,P	V,A	22	
<i>Pteroglossus pluricinctus</i>	Many-banded Aracari	LB-BT	V,A	22	
PICIDAE					
<i>Picumnus squamulatus</i>	Scaled Piculet		V	22	
<i>Melanerpes formicivorus</i>	Acorn Woodpecker		V	22	
<i>Melanerpes cruentatus</i>	Yellow-tufted Woodpecker	LA,LB-BT	V,A,F	22	
<i>Dryobates fumigatus</i>	Smoky-brown Woodpecker		V	22,36	
<i>Dryobates dignus</i>	Yellow-vented Woodpecker		V	22	CE
<i>Campephilus melanoleucos</i>	Crimson-crested Woodpecker	LM	V,A		
<i>Dryocopus lineatus</i>	Lineated Woodpecker	LA,LB-BT,P	V,A,F	22	

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Colaptes rubiginosus</i>	Golden-olive Woodpecker		V	22	
<i>Colaptes rivoli</i>	Crimson-mantled Woodpecker	CQ	V,A	22,36,54	
FALCONIDAE					
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Laughing Falcon	LB-BT,P	V,A,F		
<i>Caracara plancus</i>	Crested Caracara	P	V,A,F		
<i>Milvago chimachima</i>	Yellow-headed Caracara	ER,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel	ER,LM,P	V,F	22,36	
<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Ch	V	22,ES	Mb, P
<i>Falco rufigularis</i>	Bat Falcon	LM	V		
<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon		V	22	Mb
PSITTACIDAE					
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Rusty-faced Parrot		V	54	CE, NT(VU)
<i>Pionus menstruus</i>	Blue-headed Parrot	LA	V,A	22	
<i>Pionus chalcopterus</i>	Bronze-winged Parrot	LA,LB-BT,P	V,A	22	CE
<i>Amazona amazonica</i>	Orange-winged Amazon	LM	V,A		
<i>Amazona mercenarius</i>	Scaly-naped Amazon		V	36	P
<i>Forpus conspicillatus</i>	Spectacled Parrotlet	LB-BT,P	V,A,F		CE
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Brown-breasted Parakeet		V	36	E, VU(VU)
<i>Ara severus</i>	Chestnut-fronted Macaw	LB-BT	V,A		
THAMNOPHILIDAE					
<i>Thamnophilus punctatus</i>	Northern Slaty-Antshrike	LA	V,A	22	
<i>Dysithamnus mentalis</i>	Plain Antvireo	P	V,A	22	P
<i>Myrmotherula schisticolor</i>	Slaty Antwren	ER	V,A		
<i>Cercomacroides tyrannina</i>	Dusky Antbird		V	22	
<i>Cercomacra nigricans</i>	Jet Antbird	P	V,A		
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	Black-faced Antbird		V	22	
GRALLARIIDAE					
<i>Grallaria ruficapilla</i>	Chestnut-crowned Antpitta	CQ	V,A,F	13,22	
<i>Grallaria hypoleuca</i>	White-bellied Antpitta	ER,LA	V,A	22	
<i>Grallaria rufula</i>	Muisca Antpitta		V	13,22,29,54	CE
<i>Grallaria quitensis</i>	Tawny Antpitta	AC,Ag,B,Ch, Co,CT,D,QH	V,A,F	13,22,29,52,ES	
RHINOCRYPTIDAE					
<i>Scytalopus atratus</i>	White-crowned Tapaculo	ER,LA	V,A	22	
<i>Scytalopus latrans</i>	Blackish Tapaculo		V	22,54	
<i>Scytalopus griseicollis</i>	Pale-bellied Tapaculo	Ag,B,Ch,Co, CQ,CT,SR	V,A	13,22,29,36,52,54,ES	CE
FORMICARIIDAE					
<i>Chamaeza campanisona</i>	Short-tailed Antthrush	P	A		
<i>Chamaeza turdina</i>	Schwartz's Antthrush	LA	V,A	22	CE
FURNARIIDAE					

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Sclerurus albigularis</i>	Grey-throated Leaftosser	LA	V,A		
<i>Dendrocincla tyrannina</i>	Tyrannine Woodcreeper		V	36	
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Plain-brown Woodcreeper	LA	V,A	22	
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Buff-throated Woodcreeper	ER	V,A		
<i>Dendroplex picus</i>	Straight-billed Woodcreeper	P	V,A		
<i>Xenops minutus</i>	Plain Xenops	LA	V	22	
<i>Xenops rutilans</i>	Streaked Xenops	ER,P	V,A	22	
<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>	Streaked Tuftedcheek		V	54	
<i>Cinclodes albidiventris</i>	Chestnut-winged Cinclodes	AC,Ag,B,Ch, Co,CT,D,QH	V,A,F	13,22,29,36,52,ES	CE
<i>Margarornis squamiger</i>	Pearled Treerunner	Ch,CQ	V,A	13,22,36,54	P
<i>Leptasthenura andicola</i>	Andean Tit-Spinetail	AC,Ag,B,Ch, Co,D,QH	V,A,F	13,22,52,ES	
<i>Hellmayrea gularis</i>	White-browed Spinetail	Ch	V,A	13,22,54	
<i>Asthenes flammulata</i>	Many-striped Canastero	AC,Ag,B,Ch, Co,CT,D,QH	V,A,F	13,22,29,36,52,54,ES	
<i>Asthenes fuliginosa</i>	White-chinned Thistletail	Ag,B,Ch,Co,CT	V	13,22,29,54	
<i>Cranioleuca subcristata</i>	Crested Spinetail		V	22	
<i>Cranioleuca curtata</i>	Ash-browed Spinetail		V	22	
<i>Synallaxis gujanensis</i>	Plain-crowned Spinetail	LA,LB-BT	V,A	22	
<i>Synallaxis albescens</i>	Pale-breasted Spinetail	ER,LM,P	V,A	22	
<i>Synallaxis azarae</i>	Azara's Spinetail	CQ	V,A	22	
<i>Synallaxis unirufa</i>	Rufous Spinetail	Ch	V,A	13,22,54	
PIPRIDAE					
<i>Cryptopipo holochlora</i>	Green Manakin	LA	V		
<i>Masius chrysopterus</i>	Golden-winged Manakin	LA	V	22	
<i>Manacus manacus</i>	White-bearded Manakin	ER,LM	V,A		
<i>Machaeropterus striolatus</i>	Striolated Manakin	LA	V	22	
COTINGIDAE					
<i>Pipreola riefferii</i>	Green-and-black Fruiteater		V	36	
<i>Pipreola arcuata</i>	Barred Fruiteater		V	36	
<i>Ampelioides tschudii</i>	Scaled Fruiteater		V	22	P
<i>Ampelion rubrocristatus</i>	Red-crested Cotinga	B,Ch,CQ,SR	V,A,F	13,22,29,36,54	
<i>Rupicola peruvianus</i>	Andean Cock-of-the-rock	ER,LA	V,A	22	
TITYRIDAE					
<i>Tityra inquisitor</i>	Black-crowned Tityra		V	22	
<i>Tityra cayana</i>	Black-tailed Tityra	LM	V		
<i>Tityra semifasciata</i>	Masked Tityra	P	V,F	22	P
<i>Pachyramphus versicolor</i>	Barred Becard	CQ	V	22	
<i>Pachyramphus rufus</i>	Cinereous Becard		V	22	
<i>Pachyramphus polychropterus</i>	White-winged Becard	LA,LB-BT,LM,P	V,A	22	
<i>Pachyramphus albogriseus</i>	Black-and-white Becard	LA	V,A	22	
TYRANNIDAE					

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Piprites chloris</i>	Wing-barred Piprites	LA	V	22	
<i>Pseudotriccus ruficeps</i>	Rufous-headed Pygmy-Tyrant		V	36,54	
<i>Mionectes striaticollis</i>	Streak-necked Flycatcher	LA	V	22	AI
<i>Mionectes oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher	ER, LB-BT, P	V, A		P
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Sepia-capped Flycatcher	LA	V, A	22	P
<i>Leptopogon superciliosus</i>	Slaty-capped Flycatcher	ER, P	V, A	22	
<i>Rhynchocyclus fulvipes</i>	Fulvous-breasted Flatbill		V	22	
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Yellow-olive Flycatcher	ER	V, A	22	
<i>Lophotriccus pileatus</i>	Scale-crested Pygmy-Tyrant		V	22	
<i>Atalotriccus pilaris</i>	Pale-eyed Pygmy-Tyrant	LM	V, A		
<i>Hemitriccus granadensis</i>	Black-throated Tody-Tyrant		V	54	
<i>Poecilatriccus ruficeps</i>	Rufous-crowned Tody-Flycatcher	ER	V		
<i>Todirostrum cinereum</i>	Common Tody-Flycatcher	ER, LA, LB-BT, LM, P	V, A, F	22	
<i>Todirostrum chrysotrochum</i>	Yellow-browed Tody-Flycatcher	LA	V, A	22	
<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	Cinnamon Flycatcher	CQ, LA	V, A, F	22, 36, 54	
<i>Zimmerius chrysops</i>	Golden-faced Tyrannulet	ER, LA, P	V, A, F	22	
<i>Elaenia flavogaster</i>	Yellow-bellied Elaenia	LM	V, A, F		
<i>Elaenia parvirostris</i>	Small-billed Elaenia		V	22	Ma
<i>Elaenia chiriquensis</i>	Lesser Elaenia	LM	V		
<i>Elaenia frantzii</i>	Mountain Elaenia	CQ	V, A	22, 54	P
<i>Tyrannulus elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet	ER, LB-BT	V, A		
<i>Phyllomyias nigrocapillus</i>	Black-capped Tyrannulet		V	22, 54	
<i>Phyllomyias uropygialis</i>	Tawny-rumped Tyrannulet	Ch, CQ	V, A	22	P
<i>Phaeomyias murina</i>	Mouse-coloured Tyrannulet	ER	V, A		
<i>Mecocerculus poecilocercus</i>	White-tailed Tyrannulet		V	54	
<i>Mecocerculus stictopterus</i>	White-banded Tyrannulet		V	22, 54	
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	White-throated Tyrannulet	Ag, Ch, Co, CQ, D, QH, SR	V, A, F	13, 22, 29, 36, 54	P
<i>Serpophaga cinerea</i>	Torrent Tyrannulet		V	22, 36	
<i>Uromyias agilis</i>	Agile Tit-Tyrant		V	22, 54	CE
<i>Legatus leucophaeus</i>	Piratic Flycatcher	LB-BT, LM, P	V, A, F		
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee	LA, LM, P	V, A, F	22	
<i>Megarynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher	ER, LB-BT, LM	V, A, F	22	
<i>Myiodynastes hemichrysus</i>	Golden-crowned Flycatcher		V	22	
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher	ER	V, A	22	
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Rusty-margined Flycatcher	ER, LA, LB-BT, LM, P	V, A	22	
<i>Myiozetetes similis</i>	Social Flycatcher	LA, LB-BT, LM, P	V, A	22	
<i>Conopias cinchoneti</i>	Lemon-browed Flycatcher	LA	V	22	
<i>Empidonomus varius</i>	Variiegated Flycatcher	LM	V		Ma

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird	Ag,ER,LA,LB-BT, LM,P	V,A,F	22,36,ES	
<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher		V	22	Ma-R
<i>Tyrannus tyrannus</i>	Eastern Kingbird		V	22	Mb
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher	LB-BT,LM,P	V,A	22	AI
<i>Myiarchus ferax</i>	Short-crested Flycatcher	LB-BT	V,A		
<i>Myiarchus cephalotes</i>	Pale-edged Flycatcher	ER,LA	V,A	22	
<i>Silvicultrix frontalis</i>	Crowned Chat-Tyrant		V	22,54	P
<i>Ochthoeca diadema</i>	Yellow-bellied Chat-Tyrant		V	54	
<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	Slaty-backed Chat-Tyrant		V	36	
<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	Rufous-breasted Chat-Tyrant	Ch	V,A	22,36,54	
<i>Ochthoeca fumicolor</i>	Brown-backed Chat-Tyrant	AC,Ag,B,Ch,Co, CT,D,QH,SR	V,A,F	13,22,29,36,52,54,ES	P
<i>Knipolegus poecilurus</i>	Rufous-tailed Tyrant		V	22	
<i>Muscisaxicola alpinus</i>	Plain-capped Ground-Tyrant	Ag,Ch,Co	V	13,22,54,ES	CE, P
<i>Cnemarchus erythropygius</i>	Red-rumped Bush-Tyrant	Ag,Ch,Co,QH	V,A,F	22,29,52,54	
<i>Myiotheretes striaticollis</i>	Streak-throated Bush-Tyrant	Ag,Ch,CQ,CT,SR	V,A	13,22,29,36,54,ES	P
<i>Myiotheretes fumigatus</i>	Smoky Bush-Tyrant		V	22,54	
<i>Sayornis nigricans</i>	Black Phoebe		V	22	AI
<i>Empidonax virescens</i>	Acadian Flycatcher		V	22	Mb
<i>Contopus cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher	LA	V	22	NT, Mb
<i>Contopus fumigatus</i>	Smoke-coloured Pewee	CQ	V	22,36	
<i>Contopus sordidulus</i>	Western Wood-Pewee		V	22	Mb
<i>Contopus virens</i>	Eastern Wood-Pewee	LA,LB-BT	V,A	22,52	Mb
<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee	ER,P	V,A		
VIREONIDAE					
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike	ER,LB-BT,LM,P	V,A	22	
<i>Hylophilus flavipes</i>	Scrub Greenlet	LB-BT	V,A		
<i>Vireo leucophrys</i>	Brown-capped Vireo	ER,LA	V,A	22	
<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo	B,LA,LB-BT,LM	V	22	Mb-R, P
<i>Vireo flavoviridis</i>	Yellow-green Vireo		V	22	Mb
CORVIDAE					
<i>Cyanolyca armillata</i>	Black-collared Jay		V	36	CE
<i>Cyanocorax violaceus</i>	Violaceous Jay	ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Cyanocorax yncas</i>	Green Jay	ER	V,A,F	22,36	
HIRUNDINIDAE					
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow	Co,LA,P	V	22,36	
<i>Orochelidon murina</i>	Brown-bellied Swallow	Ag,B,Ch,Co, CQ,QH,SR	V	13,22,29,52,54,ES	
<i>Atticora tibialis</i>	White-thighed Swallow		V	22	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Rough-winged Swallow	ER,P	V,A	22	

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin		V	22	Ma-R
<i>Progne chalybea</i>	Grey-breasted Martin		V	22	
<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow	B,Ch	V	13,22	Mb
<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	Ch	V	13,22	Mb
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow	Ch	V	13,22	Mb
TROGLODYTIDAE					
<i>Troglodytes aedon</i>	House Wren	Ag,B,Ch,CQ,CT, D,ER,LA,B-BT,LM,P	V,A,F	13,22,29,36,52,54,ES	P
<i>Troglodytes solstitialis</i>	Mountain Wren		V	22,36	
<i>Cistothorus platensis</i>	Grass Wren		V	22,54	
<i>Cistothorus apolinari</i>	Apolinar's Wren	Ag,B,Ch,CT	V,A,F	13,22,29,52,ES	E, EN(CR)
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Thrush-like Wren	LA,LB-BT	V,A	22	
<i>Pheugopedius mystacalis</i>	Whiskered Wren	ER,LA	V,A	22	CE
<i>Pheugopedius rutilus</i>	Rufous-breasted Wren	LA,P	V,A	22	
<i>Thryophilus rufalbus</i>	Rufous-and-white Wren	LB-BT	V,A		P
<i>Cantorchilus leucotis</i>	Buff-breasted Wren	P	V,A		
<i>Cinnycerthia unirufa</i>	Rufous Wren		V	22,36,54	CE
<i>Henicorhina leucosticta</i>	White-breasted Wood-Wren	LB-BT,P	V,A	22	
<i>Henicorhina leucophrys</i>	Grey-breasted Wood-Wren	CQ,ER,LA	V,A	22,54	P
CINCLIDAE					
<i>Cinclus leucocephalus</i>	White-capped Dipper		V	22	P
TURDIDAE					
<i>Myadestes ralloides</i>	Andean Solitaire	LA	V,A	22	
<i>Catharus minimus</i>	Grey-cheeked Thrush	LB-BT,LM	V		Mb
<i>Catharus ustulatus</i>	Swainson's Thrush	LA,LB-BT	V	22	Mb, P
<i>Turdus leucops</i>	Pale-eyed Thrush		V	22	P
<i>Turdus leucomelas</i>	Pale-breasted Thrush	ER,LM	V,A	22	P
<i>Turdus nudigenis</i>	Spectacled Thrush	ER,LA,LB-BT,LM	V,A	22	
<i>Turdus ignobilis</i>	Black-billed Thrush	LA,LB-BT,LM	V,A	22	P
<i>Turdus fuscater</i>	Great Thrush	AC,Ag,B,Ch,Co, CQ,CT,D,QH,SR	V,A,F	13,22,29,36,52,54,ES	
<i>Turdus serranus</i>	Glossy-black Thrush		V	36	P
MIMIDAE					
<i>Mimus gilvus</i>	Tropical Mockingbird	LA,LB-BT,LM,P	V,A	22	
MOTACILLIDAE					
<i>Anthus bogotensis</i>	Paramo Pipit	Ch	V,A,F	13,22,52,ES	P
FRINGILLIDAE					
<i>Spinus spinescens</i>	Andean Siskin	AC,Ag,B,Ch,CQ	V,A	13,22,29,52,54,ES	CE
<i>Spinus xanogastrus</i>	Yellow-bellied Siskin	LA	V,A	22,36	P
<i>Spinus psaltria</i>	Lesser Goldfinch	CQ	V,A	22	P
<i>Chlorophonia cyanocephala</i>	Golden-rumped Euphonia	P	V	22	P

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Chlorophonia cyanea</i>	Blue-naped Chlorophonia	LA	V	22	P
<i>Euphonia chlorotica</i>	Purple-throated Euphonia	LA	V,A	22	P
<i>Euphonia chrysopasta</i>	Golden-bellied Euphonia	LB-BT	V,A		
<i>Euphonia minuta</i>	White-vented Euphonia	LB-BT	V		P
<i>Euphonia lanirostris</i>	Thick-billed Euphonia	LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Euphonia xanthogaster</i>	Orange-bellied Euphonia	LA,P	V,A	22	
<i>Euphonia mesochrysa</i>	Bronze-green Euphonia		V	22	P
PASERELLIDAE					
<i>Chlorospingus parvirostris</i>	Short-billed Chlorospingus	ER	V		
<i>Arremon assimilis</i>	Grey-browed Brushfinch		V	22,36,54	
<i>Arremon brunneinucha</i>	Chestnut-capped Brushfinch		V	22,36	P
<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow	AC,Ag,B,Ch,CQ,CT, R,LA,P,QH,SR	V,A,F	13,22,29,36,52,54	P
<i>Atlapetes albinucha</i>	White-naped Brushfinch	ER	V,A	22	
<i>Atlapetes semirufus</i>	Ochre-breasted Brushfinch	CQ,ER,LA	V,A	22,36	
<i>Atlapetes schistaceus</i>	Slaty Brushfinch	Ch	V,A	13,22,52,54	
<i>Atlapetes pallidinucha</i>	Pale-naped Brushfinch	Ch,CQ	V,A	13,22,29,36,54,ES	CE
ICTERIDAE					
<i>Sturnella magna</i>	Eastern Meadowlark	Ag,B,Ch,LB-BT,SR	V,A,F	13,22,29,36,52,54	NT
<i>Psarocolius angustifrons</i>	Russet-backed Oropendola	ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Psarocolius decumanus</i>	Crested Oropendola	LA,LB-BT,LM	V,A,F	22	
<i>Cacicus cela</i>	Yellow-rumped Cacique	LB-BT,P	V,A,F		
<i>Cacicus chrysnotus</i>	Mountain Cacique	CQ	V,A	36	
<i>Icterus cayanensis</i>	Epaulet Oriole	LB-BT	V	22	
<i>Icterus chrysater</i>	Yellow-backed Oriole	ER,LA,LB-BT,P	V,A	22	P
<i>Molothrus oryzivorus</i>	Giant Cowbird	LB-BT,LM	V		
<i>Molothrus bonariensis</i>	Shiny Cowbird		V	22	AI
<i>Quiscalus lugubris</i>	Carib Grackle	P	V,A		
<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>	Red-bellied Grackle		V	22,10	E, VU(VU)
<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Oriole Blackbird	LM	V		
PARULIDAE					
<i>Mniotilta varia</i>	Black-and-white Warbler	LA	V	22	Mb
<i>Leiothlypis peregrina</i>	Tennessee Warbler	LA,LB-BT,LM	V	22	Mb
<i>Geothlypis philadelphia</i>	Mourning Warbler	LA	V	22	Mb
<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart	LA,LB-BT,LM	V	22	Mb
<i>Setophaga cerulea</i>	Cerulean Warbler	LA,LM	V	22	NT(VU), Mb
<i>Setophaga pitayumi</i>	Tropical Parula	ER,P	V,A	22	P
<i>Setophaga fusca</i>	Blackburnian Warbler	LA	V	22,36	Mb
<i>Setophaga striata</i>	Blackpoll Warbler	LB-BT,LM	V,A	22	NT, Mb
<i>Myiothlypis nigrocristata</i>	Black-crested Warbler	Ch,CQ	V	13,22,36,54	P
<i>Myiothlypis coronata</i>	Russet-crowned Warbler		V	22	P
<i>Basileuterus culicivorus</i>	Golden-crowned Warbler	P	V	22	

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Basileuterus tristriatus</i>	Three-striped Warbler	ER	V,A	22,36,54	P
<i>Cardellina canadensis</i>	Canada Warbler	LA	V	22	Mb
<i>Myioborus miniatus</i>	Slate-throated Redstart	ER,LA	V,A	22	AI
<i>Myioborus ornatus</i>	Golden-fronted Redstart	CQ	V,A,F	22,36,54	CE
CARDINALIDAE					
<i>Piranga flava</i>	Hepatic Tanager	P	V		AI
<i>Piranga rubra</i>	Summer Tanager	Ch,LA,LB-BT,LM	V	13,22,52	Mb
<i>Piranga olivacea</i>	Scarlet Tanager	LA,LB-BT,LM	V	22	Mb
<i>Piranga leucoptera</i>	White-winged Tanager		V	22	
<i>Pheucticus aureoventris</i>	Black-backed Grosbeak		V	22,36	
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak	LA,LB-BT	V	22	Mb
THRAUPIDAE					
<i>Sericossypha albocristata</i>	White-capped Tanager		V	54	VU
<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	Plushcap		V	22,54	
<i>Chlorophanes spiza</i>	Green Honeycreeper	P	V	22	
<i>Iridophanes pulcherrimus</i>	Golden-collared Honeycreeper	LA	V	22	P
<i>Conirostrum sitticolor</i>	Blue-backed Conebill	Ch	V	13,22,54	
<i>Conirostrum rufum</i>	Rufous-browed Conebill	Ch,CQ,SR	V,F	13,22,29,54,ES	CE
<i>Sicalis flaveola</i>	Saffron Finch	LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Geospizopsis unicolor</i>	Plumbeous Sierra Finch	AC,Ag,B,Ch,Co,CT,D,QH	V,A,F	13,22,29,52,54,ES	
<i>Catamenia analis</i>	Band-tailed Seedeater	Ch	V,F	22	P
<i>Catamenia inornata</i>	Plain-coloured Seedeater	Ch	V,F	13,22,29,54,ES	
<i>Catamenia homochroa</i>	Paramo Seedeater		V	22,36	
<i>Diglossa lafresnayii</i>	Glossy Flowerpiercer	AC,Ag,Ch,Co,CT,SR	V,F	13,22,29,36,52,54,ES	P
<i>Diglossa humeralis</i>	Black Flowerpiercer	Ag,Ch,CQ,CT	V,F	13,22,29,52,54	
<i>Diglossa albilatera</i>	White-sided Flowerpiercer	Ch,CQ	V,A	13,22,54	P
<i>Diglossa sittoides</i>	Rusty Flowerpiercer	CQ	V,A	22,54	P
<i>Diglossa caerulescens</i>	Bluish Flowerpiercer	Ch,SR	V,A	13,22,36,54	P
<i>Diglossa cyanea</i>	Masked Flowerpiercer	Ch,CQ,SR	V,A,F	13,22,29,36,54	P
<i>Haplospiza rustica</i>	Slaty Finch	Ch,CQ	V	13,22,54	
<i>Volatinia jacarina</i>	Blue-black Grassquit	LA,P	V,A	22	P
<i>Loriotus luctuosus</i>	White-shouldered Tanager	ER,LM,P	V,A		
<i>Tachyphonus rufus</i>	White-lined Tanager	LA,LM,P	V,A	22	
<i>Ramphocelus carbo</i>	Silver-beaked Tanager	ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Purple Honeycreeper	ER,LB-BT	V	22	P
<i>Tersina viridis</i>	Swallow Tanager	LB-BT	V,A		P
<i>Dacnis cayana</i>	Blue Dacnis	LB-BT,LM	V		P
<i>Sporophila minuta</i>	Ruddy-breasted Seedeater	LM	V		
<i>Sporophila angolensis</i>	Chestnut-bellied Seed-Finch	P	V		

Nombre científico	Nombre en inglés	Localidades exploradas	Registro	Fuente secundaria	Endemismo, Estatus, Migración
<i>Sporophila intermedia</i>	Grey Seedeater	LB-BT	V		
<i>Sporophila luctuosa</i>	Black-and-white Seedeater	CQ	V	36	P
<i>Sporophila nigricollis</i>	Yellow-bellied Seedeater	ER,P	V,F	22	
<i>Saltator maximus</i>	Buff-throated Saltator	LB-BT,LM,P	V,A	22	
<i>Pseudospingus verticalis</i>	Black-headed Hemispingus	B,Ch	V	13,22,36,54	
<i>Gnemoscopus rubrirostris</i>	Grey-hooded Bush Tanager		V	54	
<i>Kleinotherapis atropileus</i>	Black-capped Hemispingus		V	54	
<i>Sphenopsis frontalis</i>	Oleaginous Hemispingus		V	22	
<i>Thlypopsis superciliaris</i>	Superciliaried Hemispingus	Ch,CQ	V,A	13,22,54	
<i>Coereba flaveola</i>	Bananaquit	LB-BT,LM,P	V,A,F		
<i>Tiaris olivaceus</i>	Yellow-faced Grassquit		V	22	
<i>Chlorochrysa calliparaea</i>	Orange-eared Tanager	ER	V		
<i>Schistochlamys melanopis</i>	Black-faced Tanager	LM	V		
<i>Cissopis leverianus</i>	Magpie Tanager	ER,LA,LB-BT,P	V,F	22	
<i>Iridosornis rufivertex</i>	Golden-crowned Tanager		V	22,36,54	
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Fawn-breasted Tanager		V	22	P
<i>Dubusia taeniata</i>	Buff-breasted Mountain-Tanager	B,Ch,CQ	V,A	13,22,54,ES	
<i>Anisognathus igniventris</i>	Scarlet-bellied Mountain-Tanager	AC,Ag,Ch,CQ,SR	V,A,F	13,22,36,52,54,ES	
<i>Buthraupis montana</i>	Hooded Mountain-Tanager		V	22,36,54	
<i>Sporathraupis cyanocephala</i>	Blue-capped Tanager	CQ	V,A,F	22,54	P
<i>Chlorornis riefferii</i>	Grass-green Tanager		V	54	
<i>Gnemathraupis eximia</i>	Black-chested Mountain-Tanager		V	22,54	
<i>Chalcothraupis ruficervix</i>	Golden-naped Tanager	LA	V	22	
<i>Stilpnia heinei</i>	Black-capped Tanager	LA	V,A	22	P
<i>Stilpnia cayana</i>	Burnished-buff Tanager	ER,LA,LB-BT,LM,P	V	22	
<i>Stilpnia cyanicollis</i>	Blue-necked Tanager	ER,LA,P	V,A,F	22	
<i>Tangara vassorii</i>	Blue-and-black Tanager		V	22,54	P
<i>Tangara nigroviridis</i>	Beryl-spangled Tanager	LA	V	22,36	P
<i>Tangara cyanotis</i>	Blue-browed Tanager		V	22	
<i>Tangara mexicana</i>	Turquoise Tanager	LB-BT,P	V		
<i>Tangara gyrola</i>	Bay-headed Tanager	ER,LA,P	V	22	P
<i>Tangara xanthocephala</i>	Saffron-crowned Tanager	LA	V	22	P
<i>Tangara parzudakii</i>	Flame-faced Tanager	LA	V	22	
<i>Tangara arthus</i>	Golden Tanager	LA	V	22	
<i>Thraupis episcopus</i>	Blue-grey Tanager	ER,LA,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Thraupis palmarum</i>	Palm Tanager	ER,LB-BT,LM,P	V,A,F	22	
<i>Ixothraupis guttata</i>	Speckled Tanager	ER,LA,P	V,A	22	